Tema 7: El Enlace Químico (III): moléculas poliatómicas

- 7.1 Geometría molecular: teoría RPECV (AJ3.1-31, PHH12, W8, C10)
- 7.2 Orbitales híbridos (AJ3.5-7)
- 7.3 Orbitales moleculares deslocalizados: compuestos aromáticos (AJ3.7-8, W9, C10.8)
- 7.4 Orbitales deslocalizados en sólidos. Teoría de bandas. conductores, aislantes y semiconductores (AJ3.14, S12.6, C20.3)

7.1 Geometría molecular: teoría RPECV

Teoría RPECV: *Teoría de la Repulsión de los Pares de Electrones de la Capa de Valencia*
(VSEPR en literatura anglo-sajona)

- Permite deducir a partir de la estructura de Lewis de una molécula la geometría espacial que adopta
- Se aplica principalmente a moléculas con un átomo central y varios periféricos

La geometría molecular tiene importancia dado que muchas de las propiedades de una sustancia dependen de dicha estructura

Geometrías principales en moléculas o iones poliatómicos

Una gran variedad de geometrías distintas

Geometrías principales en moléculas poliatómicas (II)

¿es posible predecir la geometría que adopta una molécula?

Ejemplos de estructuras espaciales:

La hipótesis principal del modelo RPECV

Las regiones de alta concentración de electrones (enlaces y pares libres) se repelen entre sí

Los enlaces y los pares se sitúan de forma que estén lo más alejados posible entre sí

Cuando hay varias opciones para colocar los pares:

Prelación de Fuerzas de repulsión:

par libre-par libre > par libre-par de enlace > par de enlace-par de enlace

Los enlaces múltiples se tratan como los sencillos en RPECV

1 enlace doble $\equiv$ 1 enlace simple

Obtener la estructura RPECV entorno a un átomo

1. Obtener la estructura de Lewis
2. Contar el número de enlaces alrededor de un átomo.
Los enlaces múltiples se tratan como enlaces simples.
3. Contar el número de pares electrónicos libres.
4. La suma de pares libres y número de enlaces simples determina la geometría básica (lineal, trigonal, tetraédrica, ...)
5. Disponer los pares electrónicos libres lo más alejados posibles (aplicar la prelación).
6. La geometría se nombra en base a los enlaces únicamente.

Tipos derivados de la geometría tetraédrica:

Con un par solitario o no enlazante:
piramidal

Con dos pares solitarios: angular

Debido a la mayor extensión espacial de los pares libres, los ángulos entre enlaces disminuyen.

$\text{AX}_5 \rightarrow$ bipirámide trigonal

PCl_5

$\text{AX}_6 \rightarrow$ octaédrica

7.2 Orbitales híbridos

Son orbitales atómicos

Orbitales próximos en energía pueden combinarse entre sí para formar enlaces → Hibridación

Ejemplo: el átomo de carbono Estado fundamental

aún a costa de un incremento de energía se incrementa el número de electrones desapareados (Regla de Hund)

HIBRIDACIÓN

Geometría de la hibridación sp^3

La molécula de metano

La molécula de etano

Hibridación sp

Combinación del orbital s y

1 orbital p ⇒ 2 orbitales sp

Geometría lineal

¿Cómo se predice la hibridación del átomo central?

- Escribir una estructura de Lewis aceptable.
- Utilizar la teoría RPECV para predecir la geometría probable de grupos de electrones.
- Seleccionar el esquema de hibridación correspondiente a la geometría de grupos de electrones:

Nº de pares libres + Nº de p. de enlace	Distribución de los p. de e	Hibridación	Ejemplos
2	Lineal	sp	BeCl ₂
3	Trigonal plana	sp ²	BF ₃
4	Tetraédrica	sp ³	CH ₄ , NH ₃ , H ₂ O
5	Bipirámide trigonal	sp ³ d	PCl ₅
6	Octaédrica	sp ³ d ²	SF ₆

Enlaces sigma (σ) y Pi (π)

Enlace sencillo 1 enlace sigma

Enlace doble 1 enlace sigma y 1 enlace pi

Enlace triple 1 enlace sigma y 2 enlaces pi

¿Cuántos enlaces s y p hay en la molécula de ácido acético (vinagre) CH₃COOH?

7.3 Orbitales moleculares deslocalizados: compuestos aromáticos

- ✓ Se puede combinar el método de orbitales híbridos y orbitales moleculares
- ✓ La Teoría de orbitales moleculares deslocalizados permite construir orbitales que no están asociados a un par de átomos en concreto, sino que pertenecen al conjunto de la molécula
- ✓ Un electrón situado en un orbital molecular deslocalizado puede encontrarse con una apreciable probabilidad en la cercanía de cualquiera de los átomos que han intervenido en la formación del orbital deslocalizado

El ejemplo más típico de orbitales deslocalizados es el que se presenta en el benceno:

Friedrich Kekulé propuso en 1865 una estructura cíclica con enlaces dobles y sencillos alternados:

Sin embargo se comprueba que todos los enlaces del benceno son equivalentes. El benceno se comporta como si su estructura fuera consecuencia de la resonancia entre dos estructuras equivalentes

La estructura resonante del benceno se representa de forma más adecuada así:

El anillo de 6 átomos de carbono del benceno es una estructura muy estable que da a esta sustancia y sus derivados propiedades características. A las sustancias que contienen en su estructura anillos bencénicos se las denomina compuestos aromáticos.

La molécula de benceno

C $\uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$
 sp^2 $2p_z$

Densidad electrónica en un compuesto aromático

El aminoácido tirosina "visto" por difracción de rayos-X

7.4 Orbitales deslocalizados en sólidos: Teoría de bandas

➤ Muchos sólidos (metales, sólidos iónicos y covalentes) pueden considerarse como una gran molécula en la que todos sus átomos se encuentran unidos por fuerzas de enlace químico

↓

La Teoría de Bandas es la extensión de la teoría de orbitales moleculares al caso de los sólidos

Metales: estructuras y propiedades

PROPIEDADES PRINCIPALES

- La mayoría de los metales son sólidos cristalinos a temperatura ambiente
- Son dúctiles y maleables aunque resistentes a la rotura
- Brillantes
- Conductores del calor y la electricidad

Teoría de Bandas

- Extensión de la teoría de OM
- N átomos dan N OM muy próximos en E
- los que están llenos: Banda de Valencia
- los que están vacíos: Banda de Conducción

• Modelo del "mar de e⁻"
 - Cationes fijos en un mar de e⁻ móviles

Tema 7

En el caso del Li, en el estado fundamental los e^- son los responsables del enlace de los átomos de Li entre sí. Son los e^- de valencia y la banda en la que se encuentran se llama BANDA DE VALENCIA.

Debido a que en la banda de valencia las diferencias de energía entre los niveles ocupados y sin ocupar son tan pequeñas, los e^- pueden excitarse fácilmente desde los niveles llenos más alta los vacíos, que se encuentran inmediatamente por encima de ellos. Esta excitación, que tiene el efecto de producir e^- móviles se consigue aplicando una diferencia de potencial.

Así es como la Teoría de bandas explica la capacidad de los metales de conducir la corriente eléctrica.

Conductividad Eléctrica: banda de energía parcialmente llena de $e^- \Rightarrow$ BANDA DE CONDUCCIÓN

En el Li, la banda 2s es al mismo tiempo BANDA DE VALENCIA y de CONDUCCIÓN

La conductividad eléctrica también puede darse con una banda de energía totalmente llena de e^- y otra totalmente vacía. En este caso la BANDA DE VALENCIA y de CONDUCCIÓN SON DISTINTAS

(ver ejemplo)